

CABINET VETERINAIRE SAMATHA
Dr Anouk CHARRIERE
646, route d'Orléans
45640 Sandillon
tél. : 02.38.45.87.90

La lactation nerveuse ou de pseudo-gestation

Qu'est-ce que c'est ?

La chienne va présenter **tous les signes d'une fin de gestation ou post mise-bas... sans avoir été en gestation !**

Les signes sont visibles **6 à 12 semaines après la fin des chaleurs.**

La lactation de pseudo-gestation touche principalement les **chiennes (seulement les chiennes non stérilisées)** et parfois les chattes (mais cela est beaucoup plus rare).

64% des chiennes non stérilisées présentent ce syndrome régulièrement et 7% d'entre elles ont des lactations irrégulières.

Quels sont les signes ?

Signes physiques

- **Mamelles gonflées (hypertrophie mammaire)**
- **Production de lait (hypergalactorrhée)**
- **Mamelles douloureuses**
- **Léchage des mamelles**
- **Prise de poids**

Signes comportementaux

- **Tendance à faire un nid**
- **Tendance à mater**
- **Agressivité ou déprime (chienne collante qui manque d'entrain)**
- **Appétit modifié (diminué le plus souvent)**

Quels sont les mécanismes ?

La **stimulation de la sécrétion de la prolactine** (qui induit la production de lait) est **provoquée par la chute de progesterone** (sécrétée par le corps jaune). En l'absence de gestation, la chute est plus lente que lors d'une mise bas. Cependant, chez certaines chiennes, la chute reste brutale et cela peut provoquer le syndrome de pseudo-gestation.

Pourquoi traiter ?

Pour **éviter** le risque de **mammite voire d'abcès** et parce que les hormones stéroïdiennes et la prolactine favorisent les **tumeurs mammaires**.

Pour **éviter** des **morsures** lorsque la chienne est agressive.

Pour **éviter** que la chienne ne **déprime**.

Comment traiter ?

Traitement médical

Il existe des médicaments qui inhibent la sécrétion de prolactine. Les problèmes de comportements et les modifications observables au niveau des mamelles sont alors résolus.

Il faut s'assurer que la chienne n'est pas gestante avant de les administrer !

Mesures complémentaires hygiéniques

- Il ne faut pas masser les mamelles
- Il ne faut pas chercher à évacuer le lait
- **il faut distraire la chienne** pour la faire sortir de son nid (plus de jeux et de promenade)

Attention: les chiennes qui font des grossesses nerveuses auront un risque augmenté de présenter d'autres maladies de l'appareil reproducteur, infections de l'utérus et surtout tumeurs mammaires. **IL EST DONC CONSEILLE DE STERILISER CES CHIENNES**